

病院 学会分類別にわけた各施設で提供されている嚥下調整食(とろみ)

2024.8

飲料・汁物	とろみあり			その他	
学会分類	-	薄いとろみ	中間のとろみ	濃いとろみ	
性状(飲んだとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>「drink」できる</li> <li>とろみがついていることがほとんど気にならない</li> <li>口に入れると口腔内に広がる</li> <li>細いストローでも容易に吸える</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「drink」できる</li> <li>液体の種類・味・温度によっては、とろみがついていることがあまり気にならない場合もある</li> <li>口に入れると口腔内に広がる</li> <li>ストローで容易に吸える</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「drink」できる</li> <li>明らかにとろみを感じる</li> <li>口腔内にすぐには広がらない</li> <li>舌の上でまとめやすい</li> <li>ストローで吸うのは抵抗がある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スプーンで「eat」</li> <li>明らかにとろみがついていて、まとまりがよい</li> <li>送り込むのに力が必要</li> <li>ストローで吸うことは困難</li> </ul>	
性状(見たとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>とろみがついていることが、見た目で判別できない場合もある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スプーンを傾けるとずっと流れ落ちる</li> <li>フォークの歯の間から素早く流れ落ちる</li> <li>カップを傾け、流れ出た後にうっすらと跡が残る程度の付着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スプーンを傾けるととろりと流れる</li> <li>フォークの歯の間からゆっくりと流れ落ちる</li> <li>カップを傾け、流れ出た後には、全体にコーティングしたように付着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スプーンを傾けても流れにくい</li> <li>フォークの歯の間から流れ出ない</li> <li>カップを傾けても流れ出ない(ゆっくりと塊となって落ちる)</li> </ul>	
京葉病院		トロミ③	トロミ②	トロミ①	
		お茶以外のトロミはすべて厨房で行う	お茶以外のトロミはすべて厨房で行う	お茶以外のトロミはすべて厨房で行う	
同愛会病院			茶トロミ 汁トロミ		
			病棟で個別対応		
小松川病院		うすいとろみ	とろみ	濃いとろみ	
松江病院		とろみ弱		とろみ強	
		水100mlにつるりんこsoft1g		水100mlにつるりんこsoft3g	
江戸川病院			お茶ゼリー	(汁とろみ)	
江戸川共済病院		薄めのトロミ	トロミ	強めのトロミ	
東京臨海病院			トロミ		
			食種はなくコメントで対応		
森山脳神経センター病院				汁トロミ	あんかけ
				汁物のとろみは厨房にて作成	嚥下機能上、必要な患者様にあんを別で提供(厨房でr作成し提供)
葛西中央病院		とろみ弱め	とろみ	濃いとろみ	
東京東病院		とろみ弱め	中間のとろみ	とろみ強め	
			お茶ゼリー(準備中)	お茶ゼリー(準備中)	
		汁物のとろみは統一して厨房にて付与	汁物のとろみは統一して厨房にて付与	汁物のとろみは統一して厨房にて付与	
一盛病院			とろみ	強とろみ	
		お茶以外のトロミはすべて厨房で行う	お茶以外のトロミはすべて厨房で行う	お茶以外のトロミはすべて厨房で行う	
東京心臓不整脈病院			トロミ	トロミ強め	
葛西昌医会病院			トロミ付		