

フッ化物洗口液の準備／後片付け

子どものいない別室で洗口責任者が行います

1. フッ化物洗口剤を用意する

- 鍵付きの保管場所から取り出す
- 保管庫に鍵**をかける
- 「**フッ化物洗口 薬剤管理簿**」に記録する




| フッ化物洗口剤 薬剤管理簿 | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 調剤日: _____ | | | | | | | | | |
| 品名 | 性状 | 単位 | 数量 | 在庫 | 使用 | 残量 | 備考 | 調剤者 | 確認者 |
| ミラノール | 顆粒 | 11% | 1.0g | ○ | ○ | ○ | | | |
| ミラノール | 集合 | 洗口 | 溶解 | 瓶 | S | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

フッ化物洗口剤 薬剤出納簿

2. 器材を準備する

- 洗口指示書
- フッ化物洗口剤
(ミラノール顆粒11%1.0g包)
- ディスペンサーボトル
(ミラノール集団洗口溶解瓶S)
- 水道水



フッ化物洗口指示書



ミラノール顆粒11%
1.0g包



ミラノール
集団洗口溶解瓶S

3. フッ化物洗口液を作る

- 指示書に記載された通りの洗口剤と水道水をディスペンサーボトルに入れる
- 軽く振って**溶け残りのないように溶かす

※ 洗口後の後片付け

- 洗口液は、園児の手が届かない、かつ直射日光の当たらない涼しい場所で保管する(**冷蔵庫**等)
- 週末は洗口液を廃棄**し、ディスペンサーボトルを**消毒**する

※ 0.02%次亜塩素酸ナトリウム溶液に5分浸し、その後十分水洗して乾燥させる

フッ化物洗口の実施方法

子どもたちのいる部屋で洗口担当者が行います

1. 器材を準備する

- フッ化物洗口液の入ったディスペンサーボトル
- 園児用のコップ
- バケツ
- タイマー

2. 洗口前の園児の準備

- 洗口後は30分程度飲食を控える必要があるため、洗口実施前に**水分補給**を促す

3. フッ化物洗口液をコップに注ぐ

- 水平にできる机の上に置き、ポンプを3・4回押し**空気を抜く**
- 1回プッシュして注ぐ
- 希望しない子の水道水**を準備する

4. 洗口実施



洗口液を5ml
口に含む



30秒間
ぶくぶくうがい



静かに
吐き出します

※30秒間タイマーで測る

5. 吐き出された洗口液の廃棄

- 洗口液を教室でバケツにまとめる